

## JULGAMENTO DE RECURSOS

Conforme Edital nº 001/2015 do Processo Seletivo de Bom Sucesso/MG, a empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas divulgado em 16/03/2015, separados por cargo, conforme a seguir:

**ISABELA CAMILA DE PAIVA SANTOS**

**637**

**01 a 06 Agente com. de Saúde**

### QUESTÃO 03

A questão prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação do texto. De acordo com a leitura atenta do texto, a única afirmação coerente com o trecho extraído e o comando da questão é o que se afirma na alternativa C, pois a atitude avarenta do dono do tijolo de ouro fez com que o vizinho desconfiasse de que haveria algo valioso no local e “uma noite ele pulou o muro, cavou a terra e roubou o tijolo de ouro”. Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado.

### QUESTÃO 04

A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e análise do texto. De acordo com o texto, a única alternativa que explica por que “pedra” e “tijolo de ouro” tinham a mesma serventia para o homem é a que se encontra na letra “D”. Ele tinha apenas a intenção de guardar o ouro, nunca vendê-lo para usar o dinheiro. Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado.

### QUESTÃO 06

A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos específicos do assunto abordado. De acordo com a gramática normativa, a alternativa A tem o pronome indefinido “nada”, fazendo com o que o verbo “tornar” fique no singular. A alternativa B está incorreta porque a concordância deve ser feita com o artigo definido “as”. O correto é: “Serão **proibidas** as ausências e os atrasos”. O verbo “haver”, na alternativa C, deve ficar no singular porque é impessoal e tem o sentido de “existir”. Por fim, a alternativa D está correta porque “bastantes” está funcionando como adjetivo, concordando com o substantivo “críticas”. Recurso **INDEFERIDO**, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado.

### QUESTÃO 19

Primos hipertensos não é fator de risco para a gestante. <http://www.manualmerck.net/?id=270&cn=1952>. O recurso foi **INDEFERIDO**, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado.

#### Pontuação das gravidezes de alto risco - 10 ou mais, indica um alto risco

Factores de risco	Pontuação
Antes da gravidez	
<b>Características da mãe</b>	
Com 35 anos e mais ou com 15 e menos	5
Peso inferior a 45 kg ou superior a 90 kg	5
<b>Problemas numa gravidez anterior</b>	
Feto nascido morto	10
Morte do recém-nascido	10
Recém-nascido prematuro	10
Recém-nascido pequeno para a sua idade gestacional (mais pequeno que o esperado em comparação com o número de semanas de gravidez)	10
Transusão de sangue ao feto por doença hemolítica	10
Parto pós-termo (com mais de 42 semanas)	10
Abortos repetidos	5
Recém-nascido grande (com mais de 4,5 kg)	5
Seis ou mais gravidezes completas	5
História de eclampsia (ataques durante a gravidez)	5
Cesariana	5
Epilepsia ou paralisia cerebral na mãe	5
História de pré-eclampsia (hipertensão, proteína na urina e acumulação de líquidos durante a gravidez)	1

Filho anterior com defeitos de nascença	1
<b>Deficiências estruturais</b>	10
Útero bicorne	10
Colo uterino incompetente	10
Pélvis pequena	5
<b>Problemas médicos</b>	10
Hipertensão crônica	10
Doença renal entre moderada e grave	10
Doença coronária grave	10
Diabetes com dependência de insulina	10
Drepanocitose	10
Resultados anormais num Pap	10
Afecção cardíaca moderada	5
Doença da tireóide	5
História de tuberculose	5
Doença pulmonar, como asma	5
Resultado positivo em testes de sífilis ou do vírus da imunodeficiência humana (HIV)	5
História de infecção da bexiga	1
História familiar de diabetes	

**JANDERSON RIFF SILVA**

**354**

**09 Médico Pediatra**

#### QUESTÃO 10

De acordo com o contexto o vocábulo “luzir” tem como significado “Exibir”. Portanto o recurso foi **DEFERIDO**, altera-se o gabarito de “C” para “B”.

**BRUNA APARECIDA AVELAR**

**227**

**12 Nutricionista**

#### QUESTÃO 18

Houve um equívoco na marcação do gabarito. Em geral, os hormônios contra - reguladores (glucagon, hormônio de crescimento, cortisol, epinefrina, norepinefrina) tem efeitos semelhantes ao da insulina. Recurso **DEFERIDO**, altera-se o gabarito de “B” para “D”.

**MARIA JOSÉ DE LOURDES OLIVEIRA**

**552**

**13 Odontólogo**

#### QUESTÃO 11

Pede-se cancelamento da questão, pois faltou na redação da pergunta a palavra “semi-inclusos” São indicações para remoção de dentes inclusos ou semi-inclusos, exceto: Dentes inclusos não podem apresentar quadros de pericoronarite aguda, pois não irromperam a mucosa, assim como também não podem ter sua higienização dificultada. Portanto o recurso foi **DEFERIDO**, questão **ANULADA**.

#### QUESTÃO 16

Utilizando como referência teórica a versão atualizada do livro do autor citado pela candidata na redação do pedido do recurso em questão, não foi identificado o texto redigido pela mesma. Como transcrito abaixo, não há dúvidas quanto o relato das possíveis sequelas nos dentes decíduos traumatizados:

-*Hiperemia pulpar* - “É a resposta inicial da polpa, tendo como característica o aumento na vascularização e pequena infiltração celular.” - *Hemorragia pulpar* - “Ocorre quando, após a hiperemia pulpar, o aumento da pressão interna dos vasos leva à ruptura dos capilares da polpa.” - *Calcificação pulpar* - “Ocorre quando há deposição acelerada de tecido duro na câmara pulpar, no canal radicular ou em ambos, como resposta à falta de suprimento neurovascular da polpa.” - *Necrose pulpar* - “A morte do tecido pulpar pode ocorrer quando houver rompimento do feixe vasculonervoso, hiperemia pulpar com compressão dos vasos apicais ou fratura coronária de esmalte e dentina com ou sem exposição pulpar não tratada, e, conseqüentemente com contaminação por bactérias.” - *Reabsorção interna da coroa ou raiz* - “As células do tipo clasto se fixam apenas em tecidos mineralizados, dessa forma, para que essas células iniciem o processo da reabsorção interna, é necessário que ocorra a remoção da camada odontoblástica e da pré-dentina. Nos casos de traumatismo dental, o deslocamento localizado de pré-dentina e dos odontoblastos pode iniciar a reabsorção interna (...) A reabsorção interna pode ocorrer na região coronária ou radicular. Quando ocorre na região coronária, clinicamente pode ser observado uma área rósea ou avermelhada (mancha rósea). Radiograficamente apresenta uma área radiolúcida de contornos regulares. Já a reabsorção interna radicular apresenta radiograficamente uma imagem radiolúcida em forma de balão de contorno regular, com expansão local da luz do canal radicular.” - O recurso foi incompreensível, visto que a candidata, no discorrer da sua argumentação, confunde os conceitos de reabsorção externa e interna de raiz e reafirma a alternativa do gabarito oficial.

**Texto redigido pela candidata:** *“O trauma pode causar reabsorção radicular devido promover no periodonto uma ampla lesão tecidual, com morte de cementoblastos em vastas áreas da superfície cementária, este é o fenômeno-chave na iniciação da reabsorção dentária, pois estas células são as guardiãs da integridade da raiz. Já a reabsorção coronária é caracterizada por área rosada no terço cervical. Radiograficamente tem-se uma área radiolúcida e geralmente está associado com restauração profunda (Consolaro, 2005). Caso a reabsorção coronária e radicular estiver relacionada com o trauma pode acontecer na raiz e na coroa.”* Cementoblastos são células presentes no cimento, componente externo da raiz. Referência bibliográfica: Odontopediatria - Guedes-Pinto AC - 8ª Edição 2010 - Capítulo 35: Lesões traumáticas em dentes decíduos e permanentes. p. 705. Portanto o recurso foi **INDEFERIDO**, mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado.

Belo Horizonte, 06 de Abril de 2015.

**Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda.**